

Credelio 12 mg comprimidos mastigáveis para gatos (0,5-2,0 kg) / Credelio 48 mg comprimidos mastigáveis para gatos (> 2,0-8,0 kg). Titular da AIM Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Alemanha. Cada comprimido mastigável contém: Substância ativa:

Indicações de utilização: Para o tratamento das infestações por pulgas e carraças em gatos. Este medicamento veterinário tem atividade imediata e persistente na eliminação das pulgas (*Ctenocephalides felis* e *C. canis*) e carraças (*Ixodes ricinus*) durante 1 mês. As pulgas e as carraças devem estar fixas no hospedeiro e iniciar a alimentação de modo a serem expostas à substância ativa. O medicamento veterinário pode ser usado como parte da estratégia de tratamento da dermatite alérgica à picada da pulga (DAPP). Posologia e via de administração: Para administração oral. O medicamento veterinário aromatizado deve ser administrado de acordo com a tabela seguinte para assegurar uma dose única de 6 a 24 mg de lotilaner/kg de peso corporal.

Credelio comprimidos mastigáveis	lotilaner (mg)
para gatos 0,5-2,0 kg	12
para gatos > 2,0-8,0 kg	48

Peso corporal do gato (kg)	Dosagem e número de comprimidos a serem administrados	
	Credelio 12 mg	Credelio 48 mg
0,5-2,0	1	
> 2,0-8,0		1
> 8,0	Combinação adequada de comprimidos	

Para gatos com peso corporal superior a 8 kg, administrar uma combinação apropriada de dosagens disponíveis para alcançar a dose recomendada de 6-24 mg/kg. Administre o medicamento veterinário com alimentos ou até 30 minutos após a ingestão de alimentos. Para um controlo ideal de infestações por carraças e pulgas, o medicamento veterinário deve ser administrado a intervalos mensais e continuado ao longo da estação das pulgas e/ou carraças com base nas situações epidemiológicas locais. Contra-indicações: Não administrar em casos de hipersensibilidade à substância ativa ou a algum dos excipientes. Eventos adversos: Muito raros (<1 animal/10 000 animais tratados, incluindo notificações isoladas): Vômitos¹. ¹ Geralmente desaparecem sem tratamento. Espécie-alvo: Felinos (gatos). A notificação de eventos adversos é importante. Permite a monitorização contínua da segurança de um medicamento veterinário. As notificações devem ser enviadas, de preferência por um veterinário, ao titular da Autorização de Introdução no Mercado ou à autoridade nacional competente através do sistema nacional de farmacovigilância veterinária. Para obter informações de contacto, consulte também a última secção do Folheto Informativo. Advertências especiais para cada espécie-alvo: Os parasitas necessitam iniciar a alimentação no hospedeiro para serem expostos ao lotilaner; como tal, o risco de transmissão de doenças infecciosas transmitidas pelos parasitas não pode ser completamente excluído. Poderão não ser alcançados níveis aceitáveis de eficácia se o produto medicinal veterinário não for administrado com alimentos ou até 30 minutos após a ingestão de alimentos. Devido à insuficiência de dados que apoiem a eficácia contra carraças em gatos jovens, este produto não está recomendado para o tratamento das carraças em gatinhos com idade igual ou inferior a 5 meses AIM n.º: EU/2/17/206/016-21. Data da primeira autorização: 25/04/2017. Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.

Nome do medicamento veterinário: Credelio 56 mg comprimidos mastigáveis para cães (1,3-2,5 kg) Credelio 112 mg comprimidos mastigáveis para cães (> 2,5-5,5 kg) Credelio 225 mg comprimidos mastigáveis para cães (> 5,5-11 kg) Credelio 450 mg comprimidos mastigáveis para cães (> 11-22 kg) Credelio 900 mg comprimidos mastigáveis para cães (> 22-45 kg) Titular da AIM: Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Alemanha. Cada comprimido mastigável contém: Substância ativa:

Espécies-alvo: Caninos (cães). Indicações terapêuticas: Para o tratamento das infestações por pulgas e carraças em cães. Este medicamento veterinário tem atividade imediata e persistente na eliminação das pulgas (*Ctenocephalides felis* e *C. canis*) e carraças (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *I. hexagonus* e *Dermacentor reticulatus*) durante 1 mês. As pulgas e as carraças devem estar fixas no hospedeiro e iniciar a alimentação de modo a serem expostas à substância ativa. O medicamento veterinário pode ser usado como parte da estratégia de tratamento da dermatite alérgica à picada da pulga (DAPP). Para o tratamento da demodicose (causada por *Demodex canis*). Posologia e via de administração: Para administração oral. O medicamento veterinário deve ser administrado de acordo com a tabela seguinte para assegurar uma dose de 20 a 43 mg de lotilaner/kg de peso corporal.

Credelio comprimidos mastigáveis	lotilaner (mg)
para cães 1,3-2,5 kg	56,25
para cães > 2,5-5,5 kg	112,5
para cães > 5,5-11 kg	225
para cães > 11-22 kg	450
para cães > 22-45 kg	900

Peso corporal do cão (kg)	Dosagem e número de comprimidos a serem administrados				
	Credelio 56 mg	Credelio 112 mg	Credelio 225 mg	Credelio 450 mg	Credelio 900 mg
1,3-2,5	1				
> 2,5-5,5		1			
> 5,5-11,0			1		
> 11,0-22,0				1	
> 22,0-45,0					1
45	Combinação adequada de comprimidos				

Administrar a combinação apropriada de dosagens disponíveis para alcançar a dose recomendada de 20-43 mg/kg. Os comprimidos de Credelio são mastigáveis, aromatizados e palatáveis. Administre o(s) comprimido(s) a intervalos mensais, com ou após a ingestão de alimentos. Para o tratamento da demodicose (causada por *Demodex canis*): A administração mensal do medicamento veterinário durante dois meses consecutivos é eficaz e leva a uma melhoria acentuada dos sinais clínicos. O tratamento deve ser continuado até que sejam obtidas duas rapagens de pele negativas com um mês de intervalo. Casos graves podem exigir tratamentos mensais prolongados. Como a demodicose é uma doença multifatorial, é aconselhável, sempre que possível, tratar também adequadamente qualquer doença subjacente. Contra-indicações: Não administrar em caso de hipersensibilidade à substância ativa ou a algum dos excipientes. Eventos adversos: Muito raros (<1 animal/10 000 animais tratados, incluindo notificações isoladas): Diarreia^{1,2}, Vômitos^{1,2}, Anorexia^{1,2}, Letargia², Ataxia³, Convulsões³, Tremores³. ¹ Leves e transitórios; ² Geralmente desaparecem sem tratamento; ³ Na maioria dos casos são transitórios. Espécie-alvo: Caninos (cães). A notificação de eventos adversos é importante. Permite a monitorização contínua da segurança de um medicamento veterinário. As notificações devem ser enviadas, de preferência por um médico veterinário, ao titular da Autorização de Introdução no Mercado ou à autoridade nacional competente através do sistema nacional de farmacovigilância veterinária. Para obter informações de contacto, consulte também a última secção do Folheto Informativo. Advertências especiais para cada espécie alvo: Os parasitas necessitam iniciar a alimentação no hospedeiro para serem expostos ao lotilaner; como tal, o risco de transmissão de doenças infecciosas transmitidas pelos parasitas não pode ser completamente excluído. AIM n.º: EU/2/17/206/001-015 Data da autorização: 25 de Abril de 2017. Medicamento veterinário sujeito a receita médico-veterinária.